



Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 017 – SCIH – FCECON Página: 1/3	
Título do Documento	TÉCNICA DE CURATIVO EM INCISÕES COM PONTOS SUBTOTAIIS OU TOTAIS	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: TCIPSTT

Elaboração: Enfª Marielle Colares Magalhães Martins Coordenadora da CCIH	
Revisão: Drª Silvia Santos Infectologista da CCIH	
Aprovação: Drª Hilka Flávia Barra do Espírito Santo Alves Pereira Diretora Técnica da Fcecon	

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 017 – SCIH – FCECON Página: 2/3	
Título do Documento	TÉCNICA DE CURATIVO EM INCISÕES COM PONTOS SUBTOTAIIS OU TOTAIS	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: TCIPSTT

1. OBJETIVOS:

- 1.1. Prevenir infecções em lesões fechadas de incisão com pontos subtotais ou totais.

2. FINALIDADES:

- 2.1. Observar sinais flogísticos na incisão cirúrgica;
- 2.2. Fechar a incisão se houver necessidade ou se os pontos estiverem abertos.

3. MATERIAIS:

- 3.1. CM
- 3.2. Gazes estéreis
- 3.3. S. F. 0,9 %
- 3.4. Esparadrapo ou fita hipoalergênica
- 3.5. Luva estéril
- 3.6. Seringa 20ml
- 3.7. Agulha 40x12

4. RESPONSÁVEIS:

- 4.1. Enfermeiro;
- 4.2. Técnico de Enfermagem;
- 4.3. Equipe de Comissão de Cuidados com a Pele.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS:

- 5.1. Higienizar as mãos
- 5.2. Reunir material e levá-lo próximo ao leito do paciente;
- 5.3. Explicar ao paciente o procedimento a ser realizado;
- 5.4. Colocar biombo para preservar o paciente se necessário;
- 5.5. Manter paciente em posição adequada, expondo apenas a área a ser tratada;
- 5.6. Abrir o pacote de curativo com técnica asséptica;
- 5.7. Lavar todos os campos subtotais com jato de soro fisiológico à 0,9%, utilizando seringa de 20 ml com agulha 40x12, colocando uma gaze do lado oposto para reter a solução;
- 5.8. Limpar a incisão, utilizando os movimentos semicirculares, de dentro para fora, de cima para baixo, utilizando as duas faces da gaze, sem voltar ao início da incisão incluindo os pontos totais ou subtotais;
- 5.9. Limpar as regiões laterais da incisão cirúrgica após ter feito a limpeza da incisão principal e do primeiro ponto total e subtotal;

Tipo de Documento	PROCEDIMENTO/ROTINA	POP 017 – SCIH – FCECON Página: 3/3	
Título do Documento	TÉCNICA DE CURATIVO EM INCISÕES COM PONTOS SUBTOTAIIS OU TOTAIS	Emissão: 2024	Versão: 03
		Próxima revisão: 2027	Sigla: TCIPSTT

- 5.10. Secar a incisão cirúrgica;
- 5.11. Proteger a área principal (Incisão central e pontos totais ou subtotais) com gaze seca em quantidade suficiente para cobrir a área, fixar com esparadrapo ou micropore;
- 5.12. Colocar o nome, a data e o horário sobre o curativo, quando estiver coberto;
- 5.13. Manter o curativo coberto enquanto houver exsudação. Realizar a troca após 24 horas ou sempre que estiver saturado (úmido);
- 5.14. Deixar o paciente confortável e a unidade em ordem;
- 5.15. Lavar as mãos;
- 5.16. Anotar no relatório de enfermagem o procedimento realizado e a característica sítio de inserção.

6. REFERÊNCIAS:

JORGE, S. A. et al. **Abordagem Multiprofissional do Tratamento de Feridas**. São Paulo. Editora Atheneu, 2003.

CARMAGNANI, M.I.S. et al. **Procedimentos de Enfermagem: Guia prático**. 1ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan, 2011.

IRION, G. **Feridas: Novas Abordagens, Manejo Clínico e Altas em Cores**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.